

葉から入って根まで枯らす **除草剤**

サンフロン®

成分:グリホサートイソプロピルアミン塩41%

10年連続

No.1

※2004農業年度～2013農業年度グリホサートイソプロピルアミン塩41%出荷実績



安心 安全
農林水産省
登録農薬

農林水産省登録
登録番号 第18814号

厳しい審査をクリア

急性毒性試験

慢性毒性試験
(発がん性試験等)

薬効薬害試験

残留性試験



豊富なラインナップ


500ml

2L

5L

10L

20L


土に成分が
残らないので
安心



適用作物と使用方法

平成27年4月現在

1. 散布処理

(使い方: 本剤を水で希釈して、雑草木の茎葉に散布。樹木等では植栽地を除く。)

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数
			葉量(m ²)	希釈水量(ℓ)	
果樹類 (かんきつを除く)	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500	通常散布	3回以内
	多年生雑草		500~1000	50~100	
かんきつ	一年生雑草	同上	250~500	通常散布	3回以内
	多年生雑草		500~1000	50~100	
水田作物 (水稲を除く)	一年生雑草	耕起20~10日前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	1回
移植水稲		収穫14日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	500~1000		2回以内
直播水稲	同上			同上	同上
水田作物 (水田畦畔)	多年生雑草	同上	同上	同上	同上
水田作物 (水田刈跡)	一年生雑草	雑草生育期	250~500	500~1000	1回
水田作物、畑作物 (休耕地)	多年生雑草	同上	同上		同上
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	250~500	少量散布 25~50	2回以内
		は種10日以前(雑草生育期)			
だいず	は種後出芽前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	100	1回		
かんしょ	耕起前(雑草生育期)				
ばれいしょ	耕起前又は植付前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	100	1回		
野菜類 (だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、なすを除く)	耕起7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)			250~500	3回以内
	は種後出芽前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)				
えだまめ	耕起7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	少量散布 25~50	100		
ねぎ	耕起7日前まで(雑草生育期)	少量散布 25~50			
たまねぎ	耕起7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	100	1回		
	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	少量散布 25~50			
トマト、きゅうり、なす	耕起7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	100	3回以内		
麦類 (小麦を除く)	一年生雑草	耕起7日前まで(雑草生育期)	50~100	1回	
小麦		耕起7日前まで(雑草生育期)			
雑穀類	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500	50~100	1回
	さとうきび ^{※1}	多年生雑草			
茶	一年生雑草	摘採7日前まで(雑草生育期)	250~500	50	2回以内
	多年生雑草	更新・造成の10日以前 (雑草生育期)	500~1000		
牧草 ^{※2}	一年生及び 多年生雑草	は種10日前~は種当日 (耕起整地後) (雑草発生前期)	250~500	50	2回以内
	ススキ、ササ類等の 多年生雑草 落葉雑草かん木	生育盛期以降(夏~秋期)	1000		
樹木等 ^{※4}	一年生雑草	雑草生育期(草丈30cm以下)	500	100	3回以内
	多年生雑草		1000		
	スギナ	雑草生育期	2000	50~100	

2. 注入処理

作物名	適用雑草名	使用時期	希釈倍率	使用液量	使用方法	本剤の使用回数	
林木 ^{※5}	クズ・フジ等の つる類	生育 初期	原液 又は 2倍液	つる径2cm以下	0.5ml/株	つる注入 処理	1回
				2.1~3.0	1.0		
				3.1~4.0	1.5		
				4.1~5.0	2.0		
				5.1cm以上	適宜増量		
	竹類	夏期	原液	5~10ml/本	竹界 注入処理		

頑固な雑草も根まで
しっかり枯らす



成分が土壌に
残留しないので安心。



人や動物に対しても
高い安全性。



頑固なスギナや
ササ・竹も枯らす。

果樹下草の使用事例



一年生雑草 100倍

イネ科雑草・オオバコ・スズメノカタビラ
ギシギシ・タンポポ 等

多年生雑草 50倍

ツクサ・クズ・セイタカアワダチソウ
イタドリ・クログワイ・ドクダミ・セリ 等

ササ30倍 スギナ25倍

原液注入処理



竹

2~5ヶ月で枯れます!

希釈表

水量	サンフーロン必要量		
	100倍	50倍	25倍
5ℓ	50ml	100ml	200ml
10ℓ	100ml	200ml	400ml
20ℓ	200ml	400ml	800ml
50ℓ	500ml	1ℓ	2ℓ
100ℓ	1ℓ	2ℓ	4ℓ

◆適用場所 ※1さとうきび: 圃場内の周縁部、※2牧草: 牧草草地、※3林木(散布処理): 造林地(地こしらえ)、※4樹木等: 公園・庭園・農道・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面・鉄道等、※5林木(注入処理): 林地・放置竹林(竹類)
●使用前にラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所に置かないで下さい。

詳しい製品情報はホームページでもご確認できます

<http://www.taiseinozai.co.jp/sunfulon>

大成農材株式会社
 広島県広島市中区鉄砲町7-8